



USO DE MEDICAMENTOS E FATORES ASSOCIADOS EM ADULTOS DE RIO BRANCO, ACRE

#100596 Luana Christina Esteves das Neves (Luana Christina Esteves das Neves) (/proceedings/100058/authors/340587)¹; Thatiana Lameira Maciel Amaral (Thatiana Lameira Maciel Amaral) (/proceedings/100058/authors/340588)²; Gina Torres Rego Monteiro (Gina Torres Rego Monteiro) (/proceedings/100058/authors/338732)³; Maurício Teixeira Leite de Vasconcellos (Maurício Teixeira Leite de Vasconcellos) (/proceedings/100058/authors/340589)⁴; Emmerson Corrêa Brasil da Costa (Emmerson Corrêa Brasil da Costa) (/proceedings/100058/authors/340590)¹

)

e%3Fdestination%3D/saude-coletiva-2018/papers/uso-de-medicamentos-e-fatores-associados-em-adultos-de-rio-branco--acre)

Apresentação/Introdução

O uso de medicamentos tem aumentado em consonância com a transição demográfica e epidemiológica, marcada pelo envelhecimento populacional e aumento das doenças crônicas, maior acesso aos serviços de saúde e o crescente avanço das indústrias farmacêuticas.

Objetivos

Analisar o uso de medicamentos e os fatores associados em adultos de 18 a 59 anos.

Metodologia

Trata-se de um estudo transversal de base populacional, na zona rural e urbana na cidade de Rio Branco, no período de abril a setembro de 2014. Para seleção dos participantes utilizaram-se procedimentos de amostragem por conglomerados em dois estágios. A análise dos dados foi realizada utilizando o Complex samples do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS v.20.0), nas análises de diferença de grupos utilizou-se o Qui-quadrado de Pearson. A Razão de prevalência foi estimada com respectivo intervalo de confiança de 95% e as associações foram estimadas por meio da regressão de Poisson, mediante modelagem hierárquica. Nível de significância $\alpha = 0,05$.

Resultados

A prevalência no uso de medicamentos detectada nesse estudo foi de 29,4%. Após análise ajustada, o uso de medicamentos foi associado as variáveis idade (50 a 59 anos RP:2,41; IC95%:2,34-2,49), sexo (RP:1,26; IC95%:1,23-1,28), escolaridade (RP=1,13; IC95%:1,10-1,15), e autoavaliação de saúde (ruim e muito ruim RP:1,52; IC95%:1,48-1,56). As morbilidades foram incluídas no nível proximal estando associadas as doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, insônia, depressão, número de queixas de saúde e utilização do serviços de saúde.

Conclusões/Considerações

Compreender os fatores associados ao uso de medicamentos em uma sociedade favorece a realização de ações nos serviços de saúde relacionados à melhor utilização e aquisição de medicamentos.

Tipo de Apresentação

Comunicação Oral Curta

Instituições

¹ Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde na Amazônia Ocidental, Universidade Federal do Acre, Rio Branco, Acre- Brasil.;

² Centro de Ciências da Saúde e do Desporto, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Acre, Rio Branco, Acre, Brasil. ;

³ Escola Nacional de Saúde Pública - FIOCRUZ ;

Eixo Temático

Medicamentos e Assistência Farmacêutica

Como citar este trabalho?