

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO SIMPLIFICADO PARA AVALIAÇÃO DE SINTOMAS DO TRATO URINÁRIO INFERIOR (UWIN-BR)

Caroline Santos Silva (Caroline Santos Silva) (/proceedings/100058/authors/337743)¹; Ueslei Menezes de Araujo Pereira (Ueslei Menezes de Araujo Pereira) (/proceedings/100058/authors/337745)¹; Mateus Andrade Alvaia (Mateus Andrade Alvaia) (/proceedings/100058/authors/337741)¹; Kátia Santana Freitas (Kátia Santana Freitas) (/proceedings/100058/authors/342443)¹; Anna Paloma Martins Rocha Ribeiro (Anna Paloma Martins Rocha Ribeiro) (/proceedings/100058/authors/337740)¹; Bruna Matos Santos (Bruna Matos Santos) (/proceedings/100058/authors/337746)¹; Monique Tonani Novaes (Monique Tonani Novaes) (/proceedings/100058/authors/342444)¹; Breno Batista de Oliveira (Breno Batista de Oliveira) (/proceedings/100058/authors/342445)¹; Leopoldo Pires da Silva Netto (Leopoldo Pires da Silva Netto) (/proceedings/100058/authors/342446)¹; José de Bessa Júnior (José de Bessa Júnior) (/proceedings/100058/authors/337747)¹

#101155

apers/adaptacao-transcultural-e-validacao-do-instrumento-simplificado-para-avaliacao-de-sintomas-do-trato-urinario-inferior--u)

Apresentação/Introdução

O International Prostatism Symptom Score (IPSS) é o instrumento consolidado na avaliação de sintomas do trato urinário inferior (STUI) em homens no mundo, mas pacientes com baixo nível educacional demonstram dificuldade em completa-lo com precisão. O questionário UWIN foi desenvolvido como uma versão mais simples e curta, com a intenção de melhorar a precisão e minimizar o erro na avaliação de STUI

Objetivos

Realizar a adaptação transcultural e validação do questionário Urgency, Weak Stream, Incomplete Emptying and Nocturia (UWIN) para pacientes com STUI em comparação com o International Prostatism Symptom Score (IPSS).

Metodologia

A adaptação transcultural seguiu as etapas de equivalências conceitual, de itens, semântica, operacional e pré-teste para obter a versão UWIN-Br. Para o processo de validação foram administrados o IPSS (padrão-ouro) e UWIN-Br. Um total de 100 participantes completaram cada questionário. As pontuações totais de cada participante para o IPSS (intervalo 0 a 35) e UWIN (intervalo 0 a 12) foram avaliadas utilizando o coeficiente de correlação de Spearman para determinar o nível de concordância entre os questionários.

Resultados

A idade média foi 58,43±9,83 anos e de anos estudados 9,76±4,12. Houve correlação positiva ($r=0,82$)(p

Conclusões/Considerações

O UWIN apresenta propriedades psicométricas e possibilita resultados semelhantes ao IPSS na avaliação de STUI, num formato simplificado e de mais fácil aplicabilidade. Tais características ampliam a possibilidade do uso do instrumento, especialmente nas ações de Atenção à Saúde do Homem, permitindo a detecção precoce de homens sob risco de agravamento dos STUI e direcionamento do atendimento para equipe capacitada.

Tipo de Apresentação

Oral

Instituições

¹ UEFS

Eixo Temático

Agravos e Doenças Crônicas

